

## 給寶寶最好的

瑞士Vifor大藥廠是國際上專門研發製造鐵劑的藥廠，他們所製造的鐵劑行銷全球。

**富鐵好® 滴劑**中的鐵是最新的三價鐵，使用最新的、最先進的技術製造，不同於市面上容易引起腸胃刺激、同時會產生自由基的二價鐵，富鐵好是療效佳、安全性高、病患接受度高的鐵質補充劑。

## 特色

- ★ 療效佳
- ★ 安全性高，無過量之虞
- ★ 腸胃道副作用低
- ★ 不會使牙齒變色
- ★ 可以與食物、飲料併用(例如：牛奶)
- ★ 口味佳



## 富鐵好® 滴劑

### 【成分】

1ml(20滴)含有50mg鐵，以Iron(III)-hydroxide polymaltose complex之形態存在。

### 【適應症】

治療缺鐵性貧血及鐵質缺乏症。

### 【劑量】

投予劑量和治療程視鐵缺乏嚴重度而定。

缺鐵性貧血：持續治療3~5個月，直到血紅素達到正常值，之後仍需再繼續服用數週。

鐵質缺乏症：持續治療1~2個月。

	缺鐵性貧血	鐵質缺乏症
早產兒	每日每公斤體重1-2滴 (2.5-5毫克鐵)	
嬰兒(最多至一歲)	每日10-20滴 (25-50毫克鐵)	每日8-10滴 (15-25毫克鐵)
兒童(1-12歲)	每日20-40滴 (50-100毫克鐵)	每日10-20滴 (25-50毫克鐵)
兒童(大於12歲) 成人及哺乳的母親	每日40-120滴 (100-300毫克鐵)	每日20-40滴 (50-100毫克鐵)
懷孕婦女	每日80-120滴 (200-300毫克鐵)	每日40滴 (100毫克鐵)

### 【投予方法】

每日劑量可分成數次或一次投予。富鐵好滴劑須在餐中或餐後立刻服用。

富鐵好滴劑可攪入果汁、蔬菜汁或牛奶中一起服用。加入飲料後造成輕微的變色不會改變口味或療效。

為了確保正確劑量，瓶身垂直向下，藥劑即會立即滴出。若藥劑未滴出，繼續輕敲瓶底直到藥劑滴出，不要搖晃瓶身。

【包裝】30ml/瓶

### Reference:

1. Walter T et al. Pediatrics 84(1989):7-17.
2. De Andracca I et al. Nestle Foundation Nutrition Annual Report 1990:53-62
3. Lozoff B et al. Pediatrics 2000:105:1-11


製造廠

Vifor  
International

總經銷

泰宗生物科技股份有限公司  
TCM BIOTECH INTERNATIONAL CORP.  
新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8  
電話 (02)2697-2628 傳真 (02)2697-2772

## 照顧寶寶 不缺鐵



根據統計，  
一歲以下嬰兒  
每一百人就有一人患有  
缺鐵性貧血



嬰幼兒時期缺鐵會影響  
幼童智力及學習能力的發展...

來自瑞士原廠的鐵劑

swissiron

## 「鐵」對寶寶的影響...

六個月到三歲的嬰幼兒...

如何選擇最好的鐵質補充品？

因為嬰幼兒在出生三個月後成長速率變快，血液體積增加，鐵質就會嚴重不足。

### 鐵的作用

可以在大腦快速發展的時期補充足夠的氧氣，同時也可以促進神經系統的發育更趨於完整。給寶寶補充足夠的鐵劑，才能讓寶寶擁有

- ★高智商(IQ)
- ★注意力集中，學習能力佳
- ★行為運動能力佳
- ★免疫力提高



### 臺灣兒科醫學會建議

臺灣兒科醫學會嬰兒哺育委員會，根據目前已有的實證研究，並參考國情，對嬰兒哺育建議如下：

\*鐵及鋅的補充：含有鐵的副食品可在4-6個月時開始添加，**4個月後尚未使用副食品之前，應開始每天補充口服鐵劑1mg/kg/day.**


### 研究報告證實...

研究報告證實，寶寶如果在嬰幼兒時期曾發生過鐵質缺乏，可能會影響長大後的學習發展：

- ★一歲時，心智及心理運動發展遲緩<sup>1</sup>；
- ★五歲時，平均智商分數較低<sup>2</sup>；
- ★十歲時，留級的比例比沒有發生過缺鐵的孩童高出一倍多<sup>3</sup>。

#### 嬰兒時期缺鐵會使心理智能發展指數較低


◎在一歲的時候鐵質缺乏



嬰兒時期缺鐵會導致幼童在一歲時的心智及心理運動發展遲緩。<sup>(1)</sup>

#### 嬰兒時期缺鐵使平均智商分數較低


◎健康的5歲孩童，但嬰兒時期曾有缺鐵的病史...



嬰幼兒時期缺鐵，即使鐵質回復到正常，也會使得平均智商分數較低。<sup>(2)</sup>

#### 嬰兒時期缺鐵會造成學習能力較差

◎健康的10歲孩童，但嬰兒時期曾有缺鐵的病史...




嬰幼兒時期缺鐵的小孩到了十歲的時候，留級的比例比沒有缺鐵的小孩高。<sup>(3)</sup>

## 寶寶缺鐵時該怎麼辦？

在嬰兒時期，除了哺餵母乳之外，也可添加鐵質補充品，以確保嬰兒不會發生缺鐵性貧血。

4個月以後的幼兒，可於食物中添加含鐵量較高的副食品，包括：穀類、蛋黃、綠葉青菜、紅肉等含鐵量較高的食物，或添加鐵質補充品。



### 如何選擇最好的鐵質補充品

市售的鐵質補充品包括二價鐵及三價鐵，一般來說，三價鐵的副作用較低，比較不容易發生腸胃道方面的副作用，因此，病人的接受度較高；另外，三價鐵服用時無金屬味，也不會造成牙齒的染色。

